



ESQUEMA VACINAL COVID ACIMA DE 18 ANOS, NÃO GESTANTES:

1º DOSE	2º DOSE (MESMO IMUNIZANTE DA 1º DOSE)	1ºREFORÇO	2ºREFORÇO
ASTRAZENECA	8 SEMANAS APÓS 1ºDOSE	A PARTIR DE 4 MESES APÓS A 2º DOSE	A PARTIR DE 4 MESES APÓS 1ºDOSE DE REFORÇO
PFIZER	21 DIAS APÓS A 1º DOSE	IMUNIZANTES: ASTRAZENECA OU PFIZER	IMUNIZANTES: ASTRAZENECA OU PFIZER
CORONAVAC	28 DIAS APÓS A 1º DOSE		



ESQUEMA VACINAL COVID ACIMA DE 18 ANOS, GESTANTES:

1º DOSE	2º DOSE (MESMO IMUNIZANTE DA 1º DOSE)	1ºREFORÇO	2ºREFORÇO
PFIZER	21 DIAS APÓS A 1º DOSE	A PARTIR DE 4 MESES APÓS A 2º DOSE	A PARTIR DE 4 MESES APÓS 1ºDOSE DE REFORÇO
CORONAVAC	28 DIAS APÓS A 1º DOSE	IMUNIZANTES: PFIZER OU CORONAVAC	IMUNIZANTES: PFIZER OU CORONAVAC



ESQUEMA VACINAL COVID JANSSEN ACIMA DE 18 ANOS, NÃO GESTANTES:

DOSE	1ºREFORÇO	2ºREFORÇO	3ºREFORÇO
JANSSEN	2 MESES APÓS A DOSE IMUNIZANTES: ASTRAZENECA E PFIZER	A PARTIR DE 4 MESES APÓS A 1ºDOSE DE REFORÇO IMUNIZANTES: ASTRAZENECA OU PFIZER	A PARTIR DE 4 MESES APÓS A 2º DOSE DE REFORÇO IMUNIZANTES: ASTRAZENECA OU PFIZER



ESQUEMA VACINAL COVID DE 12 À 17 ANOS:

1º DOSE	2º DOSE(MESMO IMUNIZANTE DA 1º DOSE)	1ºREFORÇO	2ºREFORÇO
PFIZER	21 DIAS APÓS A 1º DOSE	A PARTIR DE 4 MESES APÓS A 2º DOSE	NÃO INDICADO PARA A FAIXA ETÁRIA
CORONAVAC	28 DIAS APÓS A 1º DOSE	IMUNIZANTES: PFIZER OU CORONAVAC	



ESQUEMA VACINAL COVID INFANTIL

FAIXA ETÁRIA	1° DOSE	2° DOSE (MESMO IMUNIZANTE DA 1° DOSE)	REFORÇO
6 MESES À 4 ANOS 11 MESES E 29 DIAS	PFIZER BABY	4 SEMANAS APÓS A 1° DOSE	(3° DOSE) 8 SEMANAS APÓS A 2° DOSE 8
3 e 4 ANOS	CORONAVAC	4 SEMANAS APÓS A 1° DOSE	A PARTIR DE 4 MESES APÓS A D2 IMUNIZANTE: PREFERENCIALMENTE PFIZER BABY NA INDISPONIBILIDADE UTILIZAR CORONAVAC
5 à 11 ANOS	CORONAVAC	4 SEMANAS APÓS A 1° DOSE	A PARTIR DE 4 MESES APÓS A D2 IMUNIZANTE: PFIZER PEDIÁTRICA
5 à 11 ANOS	PFIZER PEDIÁTRICA	8 SEMANAS APÓS A 1°DOSE	A PARTIR DE 4 MESES APÓS A D2 IMUNIZANTE: PFIZER PEDIÁTRICA



ESQUEMA VACINAL COVID BIVALENTE

Faixa Etária	REFORÇO	REGRA
<p>Pessoas dos Grupos Prioritários a PARTIR DE 12 ANOS</p> <ul style="list-style-type: none">• IDOSOS,• PESSOAS VIVENDO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA• IMUNOCOMPRO METIDOS• TRABALHADORES DA SAÚDE,• PESSOAS COM COMORBIDADES.	A PARTIR DE 4 MESES DA ÚLTIMA DOSE DE REFORÇO MONOVALENTE OU ÚLTIMA DOSE DO ESQUEMA PRIMÁRIO	TER RECEBIDO NO MÍNIMO 02 DOSES DE VACINAS MONOVALENTES
<p>População em Geral a PARTIR DE 18 ANOS</p>		